


ANTECEDENTES

En pacientes tratados con dabigatrán, idarucizumab produce la reversión del efecto anticoagulante en minutos.



OBJETIVO

Valorar el efecto de idarucizumab en pacientes tratados con dabigatrán que presentan ictus isquémico agudo o hemorragia intracraneal.



MÉTODOS

Estudio retrospectivo realizado en Alemania. Los resultados se valoraron a través de Resonancia Magnética seriada y escalas funcionales.

RESULTADOS



120

PACIENTES


con ictus agudo pudieron ser tratados gracias al uso de idarucizumab

80 ICTUS ISQUÉMICO

40 HEMORRAGIA INTRACRANEAL

ICTUS

ISQUÉMICO



Idarucizumab permitió realizar trombolisis, que benefició al 78,1% de los pacientes con una media de 7 puntos de mejoría en la escala NIHSS.

No se observaron complicaciones hemorrágicas.

HEMORRAGIA

INTRACRANEAL



En el 89% de los pacientes con hemorragia intracerebral no se observó crecimiento del hematoma.

Media de 4 puntos de mejora en la escala NIHSS.



CONCLUSIONES

IDARUCIZUMAB en pacientes tratados con dabigatrán que sufren un:

ICTUS ISQUÉMICO

permite realizar trombolisis de forma segura y efectiva.

ICTUS HEMORRÁGICO

parece mejorar el pronóstico y reducir el riesgo de crecimiento del tamaño del hematoma.